

How is Metaboost and Blue Cross 4 in 1 administered?

If possible, warm solution to body temperature, prior to injection. Snap tip off plug, ensuring the solution can flow freely and connect the sterile needle provided. Disinfect the injection site and insert the needle under the skin of the neck or over the ribs. Gently squeeze the bag to inject the contents. The area may be massaged following injection to allow for quicker absorption of the solution. Large volumes should be distributed over more than one injection site. If complete recovery does not occur within 3-4 hours repeat injection and seek veterinary advice.

<u>Active Constituents</u>	<u>Withholding Periods</u>
Calcium (as calcium gluconate) 27.5g/L	Nil
Magnesium (as magnesium hypophosphite) 4.7g/L	
Phosphorus (as hypophosphite) 12.2g/L	
Glucose 182g/L	

Paano **Metaboost and Blue Cross** 4 sa 1 pinangangasiwaan an?

Kung posible, mainit-init na solusyon sa temperatura ng katawan, bago ang iniksyon. Naka tip plug, na tinitiyak na ang solusyon ay maaring malayang dumaloy at ikonekta ang baong karayom na ibinigay. I dispeicta ang lugar ng iiner syoan ang iineksyonan site at ipasok ang karayom sa ilalim ng balat ng leeg o sa ibabaw ng buto-buto. Malumanay pisain ang bag upang mag-iniksyon sa mga nilalaman. Ang lugar ay maaaring ipamasahé ang sumusunod na iniksyon upang payagan para sa mas mabilis na pagsipip ng solusyon. Dapat na ibinahagi Malaking volume sa paglipas ng higit sa isang iniksyon site. Kung kumpletong pagbawi ay hindi magaganap sa loob ng 3-4 na oras umuulit iniksyon at humingi ng beterinaryo payo. Tandaan: Metaboost / Blue Cross 4 sa 1 ay dapat na ginagamit kapag ang hayop ay hindi tumugon sa mga **Metaboost and Blue Cross** bilang ng hayop ay maaaring kulang sa panahon sa iba pang mga mineral.

Aktibong mga nasasakupan	withholding Panahon
Kaltsyum (bilang kaltsyum gluconate) 27.5g / L	Nil
Magnesiyo (bilang magnesiyo hypophosphite) 4.7g / L	
Posporus (bilang hypophosphite) 12.2g / L	
Asukal 182g / L	

How is Metaboost and Blue Cross CBG administered?

At the first sign of Milk Fever, the treatment should be regarded as urgent. To lessen the danger of the cow choking it is recommended that an effort is made to ensure the cow is sitting up if possible. A bale of hay or a fence post can be used to prop the cow up if available. If possible, warm solution to body temperature prior to injection.

Snap tip off plug, ensuring the solution can flow freely and connect the sterile needle provided. Disinfect the injection site and insert the needle under the skin of the neck or over the ribs. Gently squeeze the bag to inject the contents. The area should be massaged firmly following injection to allow for quicker absorption of the solution. If the cow does not respond to **AHD CBG** within 3-4 hours either repeat injection or use **AHD 4 in 1**. Note: **AHD 4 in 1** should be used when the animal does not respond to **AHD CBG** as the animal may be lacking in other minerals.

Active Constituents

Calcium Borogluconate 400g/L

Withholding Period

Nil

Paano Metaboost at Blue Cross CBG pinangangasiwaan ay?

Sa unang sanyales ng Gatas Fever, ang paggamot ay dapat na madalian. Upang mabawasan ang panganib para di mabulunan ang baka. Inirerekomenda na pagsusumikap ay ginawa upang matiyak ang baka ay upo up kung maari. Ang isang balon ng dayami o isang post bakod ay maaaring magamit upang suhayan ang baka up kung magagamit. Kung maari, mainit-init na solusyon sa temperatura ng katawan bago ang iniksyon.

Naka tip plug, na tinitiyak na ang solusyon ay maaaring malayang dumaloy at ikonekta ang boaog karayom na ibinigay. Magdisimpekta ng iniksyon site at ipasok ang karayom sa ilalim ng balat ng leeg o sa ibabaw ng buto-buto. Malumanay pisain ang bag upang mag-iniksyon. Dapat imasahe ang lugar ng matatag sumusunod na iniksyon upang payagan para sa mas mabilis na pagsipip ng solusyon. Kung ang baka ay hindi tumugon sa AHD CBG sa loob ng 3-4 na oras umuulit iniksyon at humingi ng beterinaryo payo. Tandaan: Minbal 4 sa 1 ay dapat na ginagamit kapag ang hayop ay hindi tumugon sa mga AHD CBG bilang ng hayop ay maaaring kulang sa panahon sa iba pang mga mineral.

Aktibong mga nasasakupan

Kaltsyum Borogluconate 400g / L

withholding Panahon

kawalan

